

レジメン名		略名	1クールの日数	
オニバイド+5FU+I-LV			14日	
適応病名	膵癌	所要時間	48時間	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン文献名	Lancet 2016:387:545-57			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	オニバイド	70mg/m2	点滴	d1
2	I-LV	200mg/m2	点滴	d1
3	5-FU	2400mg/m2	点滴	d1-2
4				
5				
6				
7				
8				

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg デキサート注射液	100ml 6.6mg	div	15分
②	オニバイド注 5%ブドウ注射液	70mg/m2 500mL	div	90分
③	生食	50mL	div	フラッシュ用
④	レボホリナート注 5%ブドウ注射液	200mg/m2 250mL	div	2時間
⑤	生食	50mL	div	フラッシュ用
⑥	5-FU 生食	2400mg/m2 全量100mL	div	2日間