

レジメン名		略名		1クールの日数	
CapeOX+ニボルマブ		CapeOX+Nivo		21d	
適応病名	胃癌		所要時間	120分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他( )		放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )				
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり		
臨床使用分類	■治療 (エビデンスレベル ■1 □2 □3 □4 □5 ) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他)				
エビデンス	■ガイドライン、□文献、□その他				
ガイドライン文献名	胃癌治療ガイドライン速報版				
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)	
1	カペシタビン	2000mg/m2 2x1	p.o.	d1-14	
2	Oxaliplatin	130mg/m2	d.i.v.	d1	
3	ニボルマブ	360mg	d.i.v.	d1	
4					
5					
6					
7					
8					
その他 (減量・増量規定など)					

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 CapeOX+ニボルマブ

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生食	100mL	div	ルートキープ用
②	オプジーボ 生食	360mg 100mL	div	30分
③	生食	50mL	div	15分
④	パロノセトロン デキサート	0.75mg 6.6mg	div	15分
⑤	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130mg/m2 250mL	div	120分
⑥	生食	20mL	iv	フラッシュ用