

レジメン名		略名	1クールの日数	
sLV5FU2		sLV5FU2	2W	
適応病名	大腸癌	所要時間	48h	
実施部署	■外来、■病棟、□その他( )	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )			
ガイドライン 文献名	大腸癌治療ガイドライン2005年版			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	d.i.v	d1
2	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	i.v	d1
3	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	d.i.v	d1-2
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)	中心静脈カテーテルポートを使用			

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 sLV5FU2

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp 医薬品名

① グラニセロン注  
デキサート注

投与量  
100mL  
6.6mg

投与ルート  
CVポート

点滴時間・速度  
30分

② レボホリナート注  
5%ブドウ糖

200mg/m<sup>2</sup>  
250mL

CVポート

2時間

③ 5-FU  
生理食塩水

400mg/m<sup>2</sup>  
50mL

CVポート

10分

④ 5-FU  
生理食塩水

2400mg/m<sup>2</sup>  
適量

CVポート

リアフューザーを使用して  
46時間