

レジメン名		略名	1クールの日数	
パクリタキセル・カルボプラチン療法		PAC+CBDCA	28日	
適応病名	乳癌	所要時間	150分	
実施部署	■外来、□病棟、□その他( )	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )			
ガイドライン 文献名	The Oncologist 2004;9:518-527 J Clin Oncol 20:3857-3864.			
番号	抗癌剤名(商品名)	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	div	d1,d8,d15
2	カルボプラチン	AUC2	div	d1,d8,d15
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
その他 (減量・ 増量規定 など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 パクリタキセル・カルボプラチン療法

- |  |                                |         |
|--|--------------------------------|---------|
| ① アロキシ静注用<br>デキサート<br>ファモチジン<br>ポララミン注 | 0.75mg<br>6.6mg<br>20mg<br>5mg | 30分     |
| ② パクリタキセル<br>5%ブドウ糖                    | 100mg/m <sup>2</sup><br>250ml  | 1~1.5時間 |
| ③ 生理食塩水                                | 100ml                          | 急速静注    |
| ④ カルボプラチン<br>生理食塩水                     | AUC2<br>250ml                  | 1~1.5時間 |
| ⑤ 生理食塩水                                | 20ml                           |         |