

| | | | | |
|----------------|--|----------|-------------------|-------------|
| レジメン名 | | 略名 | 1クールの日数 | |
| トラスツズマブデルクステカン | | | 21日間 | |
| 適応病名 | HER2陽性手術不能又は再発乳癌 | 所要時間 | 初回90分 2回目以降30分 | |
| 実施部署 | ■外来、■病棟、□その他() | 放射線療法 | ■なし、□あり | |
| 適応分類 | □初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他() | | | |
| エビデンス | □ガイドライン、■文献、□その他() | | | |
| ガイドライン 文献名 | Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Positive Breast Cancer | | | |
| 番号 | 抗癌剤名(商品名)・略号 | 1日投与量 | 投与法 | 投与日(d1,d8等) |
| 1 | エンハーツ | 5.4mg/kg | 点滴 | d1 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

Rp 医薬品名

① アロキシ点滴静注バッグ0.75mg
デキサート注射液

投与量

100ml

6.6mg

投与ルート

div

点滴時間・速度

15分

② エンハーツ
5%ブドウ注射液100ml

5.4mg/kg

100ml

div

初回90分 2回目以降30分

※ d2-d4 デキサメタゾン4mg内服