

レジメン名		略名		1クールの日数	
カボザンチニブ-ニボルマブ4週併用療法				28日	
適応病名	根治切除不能または転移性の淡明細胞型腎細胞癌			所要時間	60分程度
実施部署	■外来、■病棟、□その他()			放射線療法	■なし、□あり
適応分類	■初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()				
適応時表示コメント	□なし、■あり	添付資料	□なし、■あり		
臨床使用分類	■治療 (エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他)				
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他				
ガイドライン文献名	N Engl J Med. 201 ; 384(9) : 829-841.				
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)	
1	カボザンチニブ(カボメティクス)	40mg	経口	連日	
2	ニボルマブ(オプジーボ)	480mg	点滴	28日毎	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
その他(減量・増量規定など)	カボザンチニブは副作用に応じて、減量、休薬。ニボルマブは副作用に応じて休薬。各薬剤とも副作用からの改善により、再開、増量。				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 カボザンチニブ-ニボルマブ4週併用療法

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生食ヒカリ	100ml	末梢	キープ用。
②	オプジーボ 生食ヒカリ	480mg 100ml	末梢 末梢	30分以上かけて。
③	生食PLフソー	20ml	末梢	フラッシュ用。