

レジメン名		略名		1クールの日数
オブジーボ、ヤーボイ併用療法				21日
適応病名	根治切除不能または転移性の腎細胞癌	所要時間	120分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	■初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
適応時表示コメント	□なし、□あり	添付資料	□なし、□あり	
臨床使用分類	■治療(エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他)			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	Motzer RJ et al. N Engl J Med. 2018 Apr 5; 378(14): 1277-1290. Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma.			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	ニボルマブ(オブジーボ)	240mg	div	d1
2	イピリムマブ(ヤーボイ)	1mg/kg	div	d1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他(減量・増量規定など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 オブジーボ+ヤーボイ療法

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度	投与回数
①	生理食塩水	100ml	div	ルートキープ用	
②	オブジーボ点滴静注	240mg/body	div	30 min	3週間間隔で4回点滴静注。 その後は2週間間隔で点滴静注
	生理食塩水	100ml			
③	生理食塩水	50mL	div	全開	
④	ヤーボイ点滴静注	1mg/kg	div	30 min	3週間間隔で4回点滴静注
	生理食塩水	50ml			
⑤	生理食塩水	20mL	div	フラッシュ用	