

レジメン名		略名		1クールの日数	
キイトルーダ・インライタ				21日	
適応病名	根治切除不能又は転移性腎細胞癌		所要時間	30分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()		放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	■初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()				
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり		
臨床使用分類	■治療 (エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他)				
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他				
ガイドライン文献名	Rini, B. I., Plimack, E. R., Stus, V., Gafanov, R., Hawkins, R., Nosov, D., ... Powles, T. (2019). Pembrolizumab plus axitinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma. <i>New England Journal of Medicine</i> , 380(12), 1116-1127. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1816714				
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)	
1	Pembrolizumab(キイトルーダ)	200mg/body	div	d1	
2	インライタ	10mg	p.o.	毎日	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
その他(減量・増量規定など)					

レジメン名 キイトルーダ・インライタ療法

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩水	100mL	div	ルートキープ用
②	キイトルーダ 生理食塩水	200mg 100mL	div	30min
③	生理食塩水	20mL	div	フラッシュ用
	インライタ5mg錠	10mg	経口	