

患者向け説明書: DPT 三種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風) この説明書は、DPT ワクチン接種を受ける方に必要な情報をまとめたものです。接種前に必ずご確認ください。

DPT 三種混合ワクチンとは

- **対象疾患:**
 - **ジフテリア:** 咽頭炎や呼吸困難を起こし、重症化すると死亡することもある感染症。
 - **百日せき:** 激しい咳が長期間続き、乳幼児では呼吸困難や脳障害の原因になる。
 - **破傷風:** 傷口から菌が侵入し、けいれんや呼吸障害を起こす。致死率が高い。
- **目的:** これら 3 つの重篤な感染症を予防するために接種します。

接種スケジュール

- **接種回数:** 以前に接種している場合は、1 回の追加接種のみです。未接種の場合は 2 回以上の接種を検討します。
- **効果:** 10 年後を目安に DPT 三種混合ワクチンで追加接種(1 回)を検討します。

副反応について

- **よくある副反応:** 注射部位の発赤、腫れ、しこり、痛み。
- **全身反応:** 発熱、機嫌が悪くなる、食欲低下など。
- **まれな副反応:** けいれん、強いアレルギー反応(アナフィラキシー)。

接種が推奨される方

- 過去に接種を受けていない子ども。
- 破傷風の高リスクな職業(医療従事者、農業従事者など)では、成人も追加接種が推奨される場合があります。
- 百日咳は特に流行地への渡航では重要です。

接種前の注意

- 発熱や体調不良がある場合は接種を延期することがあります。
- 過去にワクチンで強い副反応があった場合は必ず医師に伝えてください。
- 他のワクチンとの接種間隔については医師に確認してください。

接種後の注意

- 接種当日は激しい運動や飲酒を控えてください。
- 注射部位を清潔に保ち、腫れや痛みが強い場合は冷やすと楽になります。
- 高熱やけいれんなど強い症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。

まとめ

DPT ワクチンは、乳幼児の命に関わる 3 つの感染症を予防するために非常に重要なワクチンです。複数回の接種で十分な免疫が得られ、安全性も高く、定期接種として広く行われています。

この説明書は一般的な情報です。詳細は必ず医師・医療機関にご相談ください。

副反応確認のため、接種後 20 分間体調確認をさせていただきます。

帰宅後、体調の変化などがございましたら下記にお問い合わせ下さい。

秋田赤十字病院 電話 018-829-5000(代表)

平日(8:30-16:30)は予防接種センターでの対応、それ以外の時間帯は救急外来での対応となります。