

レジメン名		略名	1クールの日数	
食道癌チスレリズマブ療法		食道チスレ	3W	
適応病名	食道癌	所要時間	初回は60分、2回目以降30分まで短縮可能	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、■術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	■なし、□あり	
臨床使用分類	■治療 (エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他)			
エビデンス	■ガイドライン、□文献、□その他 ()			
ガイドライン文献名	食道癌治療ガイドライン (委員会コメント) Tislelizumab Versus Chemotherapy as Second-Line Treatment for Advanced or Metastatic Esophageal Squamous Cell Carcinoma (RATIONALE-302): A Randomized Phase III Study. J Clin Oncol 40:3065-3076, 2022.			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	テビムブラ	200mg/日	div	d1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他(減量・増量規定など)				

癌化学療法処方

レジメン名 食道癌チスレリズマブ療法
(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp 医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
① 生食	100mL	点滴	ルートキープ用
② テビムブラ注 生食	200mg/日 100mL	点滴	60分以上かけて 2回目以降30分まで短縮
③ 生食	20mL		フラッシュ用