

レジメン名		略名		1クールの日数
Durvalumab+Tremelimumab				28日
適応病名	EGFR遺伝子変異、ALK遺伝子変異陰性の切除不能進行・再発の非小細胞肺癌		所要時間	150分
実施部署	■外来、■病棟、□その他()		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
適応時表示コメント	□なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療 (エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他 ()			
ガイドライン文献名	Durvalumab With or Without Tremelimumab in Combination With Chemotherapy as First-Line Therapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: The Phase III POSEIDON Study			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	イミフィンジ	1500mg/body	点滴	day1
2	イジユド	75mg/body	点滴	day1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・増量規定など)	・イミフィンジは4週おきに PD まで継続。 ・イジユドは化学療法と併用時4コースまでは3週おきに投与し、16週目に最終投与。			

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

癌化学療法処方

レジメン名 Durvalumab+Tremelimumab
(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩液 ルートキープ	50ml	点滴	15分
②	イジユド点滴静注用 生理食塩液	75mg 100ml	点滴	60分
③	生理食塩液 ルート内フラッシュ	50ml	点滴	15分
④	イミフィンジ点滴静注用 生理食塩液	1500mg 100ml	点滴	60分
⑤	生理食塩液 ルート内フラッシュ	50ml	点滴	5分