

レジメン名		略名	1クールの日数	
EC療法		EC	21日	
適応病名	乳癌	所要時間	135分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、■術後補助、■術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	J.Clin.Oncol.Vol.19,No.12,2001:3103-3110			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	エピルビシン	80mg/m ²	div	d1
2	エンドキサン	500mg/m ²	div	d1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)	エピルビシンは累積投与量900mg/m ² を超えると、うっ血性心不全に陥りやすい ため注意が必要となる			
秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会				

レジメン名 EC療法
(下に実際の投与方法を記載)

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|
| ① アロキシ静注用
デキサート | 0.75mg
6.6mg | 15分 |
| ② エピルビシン注
生理食塩水 | 80mg/m ²
50mL | 15分 |
| ③ 生食 | 100mL | 全開で |
| ④ エンドキサン
生理食塩水 | 500mg/m ²
100ml | 30分 |
| ⑤ 生理食塩水 | 20ml | |