

レジメン名		略名	1クールの日数	
FEC100療法		FEC100	21日	
適応病名	乳癌	所要時間	85分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、□進行・再発、■術後補助、■術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	Lancet 2005;365:1687-1717 J Clin Oncol 19:602-611.			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	エピルピシン	100mg/m ²	div	d1
2	エンドキサン	500mg/m ²	div	d1
3	フルオロウラシル	500mg/m ²	div	d1
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
その他 (減量・ 増量規定 など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 FEC100療法
(下に実際の投与方法を記載)

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------|
| ① アロキシ静注用
デキサート | 0.75mg
6.6mg | 15分 |
| ② エピルピシン
生食 | 100mg/m ²
50mL | 10~20分 |
| ③ 生食 | 100mL | 全開 |
| ④ フルオロウラシル
5%ブドウ糖 | 500mg/m ²
100mL | 30分 |
| ⑤ エンドキサン
生食 | 500mg/m ²
100mL | 30分 |
| ⑥ 生食 | 20mL | |