

レジメン名		略名	1クールの日数	
パージェタ・トラスツズマブ・パクリタキセル1週療法			21日間	
適応病名	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	所要時間	180～300分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	■初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	ASCO2013 #606			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	パージェタ	420mg(初回840mg)	iv	d1
2	トラスツズマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	iv	d1
3	パクリタキセル	80mg/m2	iv	d1,8,15
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)	パージェタは初回投与60分で行い、忍容性が良好であれば30分まで短縮可能			
秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会				

レジメン名 パージェタ・トラスツズマブ・パクリタキセル1週療法
(下に前投薬からの投与方法を記載)
2回目以降 (Day1)

Rp	医薬品名	投与量	点滴時間・速度
①	生食	100mL	ルートキープ用
②	パージェタ注 生食	420mg 250mL	30分
③	生食	100mL	30分
④	トラスツズマブ注 生食	6mg/kg 250mL	30分
⑤	デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 ポララミン注	6.6mg 3mg 20mg 5mg	30分
⑥	パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80mg/m2 250mL	60分
⑦	生食	20mL	