

レジメン名		略名	1クールの日数	
アテゾリズマブ・アブラキサン			28日	
適応病名	乳癌	所要時間	約120分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他( )	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )			
ガイドライン 文献名	Atezolizumab and Nab-Paclitaxel in Advanced Triple-Negative Breast Cancer			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	テセントリク	840mg/body	div	d1,d15
2	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	div	d1,d8,d15
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)				
秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会				

レジメン名 アテゾリズマブ・アブラキサン

(下に前投薬からの投与方法を記載)

day1,day15

Rp	医薬品名	投与量	点滴時間・速度
①	生食	100mL	ルートキープ用
②	テセントリク 生食	840mg/body 250mL	60分
③	生食	50mL	フラッシュ用
④	グラニセトロン点滴静注 デキサート	3mg 6.6mg	30分
⑤	生食	50mL	フラッシュ用
⑥	アブラキサン 生食	100mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分
⑦	生食	20mL	フラッシュ用
day8			
①	グラニセトロン点滴静注 デキサート	3mg 6.6mg	30分
②	生食	50mL	フラッシュ用
③	アブラキサン 生食	100mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分
④	生食	20mL	フラッシュ用