

レジメン名		略名	1クールの日数	
dose-dence EC		ddEC	14日	
適応病名	乳癌	所要時間	60分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、□進行・再発、■術後補助、■術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	・Fluorouracil and dose-dence chemotherapy in adjuvant treatment of patients with early-stage breast cancer: an open-label, 2 × 2 factorial, randomised phase 3 trial ・乳癌 診療ガイドライン 2018年版			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	エピルビシン	90mg/m ²	div	d1
2	エンドキサン	600mg/m ²	div	d1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)	エピルビシンは累積投与量900mg/m ² を超えると、うっ血性心不全に陥りやすい ため注意が必要となる			

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 dose-dence EC

(下に実際の投与方法を記載)

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------|
| ① アロキシ静注用
デキサート | 0.75mg
6.6mg | 15分 |
| ② エピルビシン注
生理食塩水 | 90mg/m ²
50mL | 15分 |
| ③ 生理食塩水 | 50mL | 全開 |
| ④ エンドキサン
生理食塩水 | 600mg/m ²
100mL | 30分 |
| ⑤ 生理食塩水 | 20ml | フラッシュ |

※ ①直前にイメンド125mg内服
d2-d3 イメンド80mg内服
d2-d4 デキサメタゾン4mg内服
d2 or d3 ジーラスタ皮下注