

レジメン名		略名	1クールの日数	
パクリタキセル・トラスツズマブ1週療法		wPAC+HER	28日	
適応病名	乳癌	所要時間	150分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、■術後補助、■術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	J Clin Oncol 19:2587-2595,2001			
番号	抗癌剤名(商品名)	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	パクリタキセル	100mg/m ²	div	d1,8,15
2	トラスツズマブ	2mg/kg(初回4mg/kg)	div	d1,8,15
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
その他 (減量・ 増量規定 など)	トラスツズマブは初回導入時のみ4mg/kgで投与する。			

レジメン名 パクリタキセル・トラスツズマブ1週療法
(下に実際の投与方法を記載)

- | | | | |
|---|----------|----------------------|--------|
| ① | デキサート | 6.6mg | 30分 |
| | ファモチジン | 20mg | |
| | グラニセトロン注 | 3mg | |
| | ポララミン注 | 5mg | |
| ② | パクリタキセル | 100mg/m ² | 60～90分 |
| | 5%ブドウ糖 | 250ml | |
| ③ | 生理食塩水 | 100ml | 急速静注 |
| ④ | トラスツズマブ | 2mg/kg | 60～90分 |
| | 生理食塩水 | 250ml | |