

レジメン名		略名	1クールの日数	
カボザンチニブ-ニボルマブ2週併用療法			14日	
適応病名	根治切除不能または転移性の淡明細胞型腎細胞癌		所要時間	60分程度
実施部署	■外来、■病棟、□その他()		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	■初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
適応時表示コメント	□なし、■あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療 (エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他)			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	N Engl J Med. 201 ; 384(9) : 829-841.			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	カボザンチニブ(カボメティクス)	40mg	経口	連日
2	ニボルマブ(オブジーボ)	240mg	点滴	14日毎
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他(減量・増量規定など)	カボザンチニブは副作用に応じて、減量、休薬。ニボルマブは副作用に応じて休薬。各薬剤とも副作用からの改善により、再開、増量。			

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 カボザンチニブ-ニボルマブ2週併用療法

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp 医薬品名

① 生食ヒカリ

投与量 投与ルート

100ml 末梢

点滴時間・速度
キープ用。

② オブジーボ
生食ヒカリ

240mg 末梢
100ml 末梢

30分以上かけて。

③ 生食PLフソー

20ml 末梢

フラッシュ用。