

レジメン名		略名	1クールの日数	
ドセタキセル・プレドニゾン療法		DP	21日	
適応病名	去勢抵抗性前立腺癌	所要時間	90~120 min	
実施部署	■外来、□病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	前立腺癌診療ガイドライン2012 (日本泌尿器科学会)、 Berthold D. et al. J Clin Oncol. 2008 : 26 (2), 242.、 Naito S, et al. Jpn J Clin Oncol. 2008 : 38: 365-72.			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	ドセタキセル	70 mg/ m2	div	d1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 ドセタキセル・プレドニゾン療法

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	デキサート注 ポララミン注 グラニセトロン注	6.6 mg 1A 3mg	div	30分
②	ドセタキセル点滴静注 生理食塩水	70mg/m ² 250mL	div	60~90分
③	生食	20mL	V	

※プレドニゾン 10mg/日 併用